Cherenkov Telescope Array
Cento nuovi occhi per scrutare il cielo

Giacomo Bonnoli
INAF - Osservatorio Astronomico di Brera

Photo: Bernhard Schoelkopf
www.tuebingen.mpg.de/~bs

Spettro della luce

$$\lambda \quad [m]$$

$$\nu = c/\lambda \quad [Hz]$$

$$E = h\nu \quad [erg]$$

$$E = h\nu \quad [eV]$$

$$E = h\nu \quad [J]$$

$$E = h\nu \quad [cal]$$

“Gamma” $E > 0.511 \text{ MeV}$ (massa dell’elettrone)

Spettro della luce

λ [m]
 $\nu = c/\lambda$ [Hz]
 $E = h\nu$ [erg]
[eV]
 [J]
 [cal]

"Gamma" $E > 0.511$ MeV (massa dell'elettrone)

Sommario

- L'universo violento: i raggi cosmici
- Astronomia Gamma con IACT
- Il futuro: il Cherenkov Telescope Array
- L'Italia (e OAB) in CTA: il progetto ASTRI
- Conclusioni

L'universo violento: i raggi cosmici

I raggi cosmici

Victor Hess con viaggi in pallone
fino a 5 km negli anni 1911-1913
dimostra che l'intensità della radiazione ionizzante
aumenta con l'altezza (**Nobel 1936**)

Domenico Pacini test sott'acqua

Composizione raggi cosmici

- Protoni e nuclei pesanti (98%), elettroni (2%)
- Fotoni (0.01–0.1%)
- Le particelle cariche sono deflesse nei campi magnetici che permeano l'universo ($B > 10^{-18}$ G) e la Galassia ($B \approx 10^{-8}$ G) per la forza di Lorentz $F = q (E + (v/c) \times B)$. Si perde il legame con la sorgente, e a terra si misura un flusso isotropo. Ad energie inferiori ad 1 TeV anisotropia indotta dal campo magnetico solare.
- I fotoni sono **neutri**, e la direzione di volo punta alla posizione celeste di partenza. Sono quindi associabili alle relative **sorgenti**, permettono di fare **astronomia** (mappa delle sorgenti gamma) e **astrofisica** (studiare i processi che in quelle sorgenti li producono. Ma anche cosmologia e **fisica delle particelle**
- Nello studio dei fotoni, i ben più frequenti protoni costituiscono un fondo, dominante in numero, che è necessario rigettare "in qualche modo" per isolare i segnali dei fotoni.

Spettro dei raggi cosmici

Spettro dei raggi cosmici

Spettro dei raggi cosmici

Qualche considerazione

- Sono tanti! $1/(\text{sec m}^2)$ da 100 GeV o più (grazie atmosfera!!)
- Chi li produce? (sopra il ginocchio a 3 PeV l'origine dovrebbe essere extragalattica)
- Quelli di altissima energia devono essere prodotti vicino! (assorbimento GZK contro CMB). Il record: 3×10^{20} eV
- Sono noti da 10-15 anni prima di sapere che la Via Lattea non è l'unica galassia, che l'universo si espande... (Hubble).
- Ma occorre conoscenze teoriche ma soprattutto tecnologie adeguate per studiarli sperimentalmente

Atmosfera

L'atmosfera e la luce (II)

Fermi/LAT

PREGI:

- sensibile da 0.1 a 300 GeV
- sempre operativo
- grande campo di vista (1/6 di cielo)
- poco fondo di protoni (anticoincidenza)

Il cielo visto da EGRET

EGRET All-Sky Map Above 100 MeV

Il cielo visto da Fermi/LAT

Fermi two-year all-sky map

Fermi/LAT

PREGI:

- sensibile da 0.1 a 300 GeV
- sempre operativo
- grande campo di vista (1/6 di cielo)
- poco fondo di protoni (anticoincidenza)

SVANTAGGI:

- Piccola area efficace ($\sim 1 \text{ m}^2$)
- Oltre una certa energia incompleta ricostruzione energetica
- Costa farlo e costa lanciarlo
- Non si ripara

Astronomia gamma con Imaging Atmospheric Cherenkov Telescopes (IACT)

Sciame da fotone (o e^+/e^-)

Uno sciame di particelle cariche (coppie $e^+ - e^-$) e fotoni

Sciame "adronico"

Rivelare gli sciami a terra

Funziona anche di giorno e con le nuvole

Grande campo osservato

Grande area efficace

AUGER

ARGO (Tibet)

Gli sciami devono essere energetici ($> 1 \text{ TeV}$)

Poca risoluzione angolare

Poca risoluzione energetica

Molto fondo

Poca sensibilità per le sorgenti deboli

Effetto Cherenkov

L'altra possibilità è osservare la radiazione ottica-UV causata dalle particelle cariche che attraversano l'atmosfera **più veloci della luce**

Effetto Cherenkov

Propriamente, non è l'elettrone superluminale ad irraggiare, ma l'atmosfera circostante, "stimolata" dal suo passaggio

servare la radiazione ottica-UV causata dalle particelle cariche che attraversano l'atmosfera più veloci della luce

Effetto Cherenkov

L'effetto è dovuto al riarrangiamento delle molecole dell'atmosfera, che si possono considerare dei dipoli elettrici.

osservare la

radiazione ottica-UV causata dalle particelle cariche che attraversano

l'atmosfera **più veloci della luce**

Effetto Cherenkov

Al transito degli elettroni energetici, i dipoli si polarizzano e si "riorientano". Nel far questo sono accelerati quindi irradiano radiazione ottica-UV causata dalle particelle cariche che attraversano l'atmosfera più veloci della luce

Effetto Cherenkov

L'onda prodotta è "più lenta" del moto dell'elettrone, nel caso in cui questo sia superluminale.

osservare la causata dalle particelle cariche che attraversano l'atmosfera più veloci della luce

Effetto Cherenkov

Al transito degli elettroni energetici i
 Questa è la ragione dell'“intersezione” dei
 fronti d'onda concentrici emessi (a tempi
 diversi) in punti diversi della traiettoria
 dell'elettrone superluminale: l'elettrone
 “sorpassa” le onde che ha causato, perché
 procede più veloce.

servare la
 causata
 e che

l'atmosfera più veloci della luce

Effetto Cherenkov

Al transito degli elettroni energetici i
 Questa è la ragione dell'"intersezione" dei
 fronti d'onda concentrici emessi (a tempi
 diversi) in punti diversi della traiettoria
 dell'elettrone superluminale: l'elettrone
 "sorpassa" le onde che ha causato, perché
 procede più veloce.

osservare la
 causata
 e che

l'atmosfera più veloci della luce

Effetto Cherenkov

Al transito degli elettroni energetici i
 Questa è la ragione dell'"intersezione" dei
 fronti d'onda concentrici emessi (a tempi
 diversi) in punti diversi della traiettoria
 dell'elettrone superluminale: l'elettrone
 "sorpassa" le onde che ha causato, perché
 procede più veloce.

osservare la
 causata
 e che

l'atmosfera più veloci della luce

Effetto Cherenkov

Al transito degli elettroni energetici i
 Questa è la ragione dell' "intersezione" dei
 fronti d'onda concentrici emessi (a tempi
 diversi) in punti diversi della traiettoria
 dell'elettrone superluminale: l'elettrone
 "sorpassa" le onde che ha causato, perché
 procede più veloce.

osservare la
 causata
 e che

l'atmosfera più veloci della luce

Effetto Cherenkov

Al transito degli elettroni energetici i
 Questa è la ragione dell'"intensezione" dei
 Un po' come fanno gli aerei supersonici,
 quando producono il "bang" sonico proprio
 perché sono più veloci delle onde sonore

servare la
 causata
 e che

l'atmosfera più veloci della luce

Effetto Cherenkov

Al transito degli elettroni energetici i
 Questa è la ragione dell'"intersezione" dei
 Un po' come fanno gli aerei supersonici,
 Questa somma coerente di piccoli
 contributi originati in posizioni e tempi
 diversi causa il "flash" come nell'immagine
 in alto a destra (interno di reattore
 nucleare, elettroni superluminali nell'acqua)

servare la
 usata
 che

l'atmosfera più veloci della luce

Effetto Cherenkov

Al transito degli elettroni energetici i
 Questa è la ragione dell'"intensezione" dei
 Un po' come fanno gli aerei supersonici,
 Questa somma coerente di piccoli
 contributi originati in posizioni e tempi
 Non c'è nessuna violazione della teoria della
 relatività in questo processo: la velocità
 limite è quella della luce nel vuoto, che è
 più alta e non viene superata!

servare la
 usata
 che
 la luce

Effetto Cherenkov

$$v < \frac{c}{n}$$

$$v > \frac{c}{n}$$

$$\beta_t \equiv \frac{v_t}{c} = \frac{1}{n}$$

Per l'acqua ad esempio, (n=1.33) la soglia critica è più bassa, circa 0.75 c. A questa velocità limite l'irraggiamento è entro un angolo piccolissimo, "tutto avanti"

Al transito degli elettroni energetici i
 Questa è la ragione dell'"intersezione" dei
 Un po' come fanno gli aerei supersonici,
 Questa somma coerente di piccoli
 contributi originati in posizioni e tempi
 Non c'è nessuna violazione della teoria della
 relatività in questo processo: la velocità
 limite è quella della luce nel vuoto, che è
 più alta e non viene superata!

servare la
 usata
 che
 alla luce

Effetto Cherenkov

$$v < \frac{c}{n}$$

$$v > \frac{c}{n}$$

$$\beta_t \equiv \frac{v_t}{c} = \frac{1}{n}$$

Per l'acqua ad esempio, (n=1.33) la soglia critica è più bassa, circa 0.75 c. A questa velocità limite l'irraggiamento è entro un angolo piccolissimo, "tutto avanti"

Al transito degli elettroni energetici i
 Questa è la ragione dell'"intersezione" dei
 Un po' come fanno gli aerei supersonici,
 Questa somma coerente di piccoli
 contributi originati in posizioni e tempi
 Non c'è nessuna violazione della teoria della
 relatività in questo processo: la velocità
 limite è quella della luce nel vuoto, che è
 più alta e non viene superata!

risparmiare la
 usata
 che
 alla luce

Effetto Cherenkov

$$v < \frac{c}{n}$$

$$v > \frac{c}{n}$$

$$\beta_t \equiv \frac{v_t}{c} = \frac{1}{n}$$

Al crescere della energia (e quindi della velocità) della carica irraggiante (al solito, un elettrone o un positrone sono esempi perfetti), l'angolo si allarga fino a superare i 40° per particelle che rasentano c

L'angolo si allarga fino a superare i 40° per particelle che rasentano c

Al transito degli elettroni energetici i

Questa è la ragione dell'"intersezione" dei

Un po' come fanno gli aerei supersonici,

Questa somma coerente di piccoli contributi originati in posizioni e tempi

Non c'è nessuna violazione della teoria della relatività in questo processo: la velocità limite è quella della luce nel vuoto, che è più alta e non viene superata!

usata
che
lla luce

Effetto Cherenkov

$$v < \frac{c}{n}$$

$$v > \frac{c}{n}$$

$$\beta_t \equiv \frac{v_t}{c} = \frac{1}{n}$$

Al crescere della energia (e quindi della velocità) della carica irraggiante (al solito, un elettrone o un positrone sono esempi perfetti), l'angolo si allarga fino a superare i 40° per particelle che rasentano c

L'angolo di apertura del cono di radiazione è dato da $\cos \theta = \frac{c}{nv}$.
 Al transito degli elettroni energetici i fotoni vengono emessi in un cono.
 Questa è la ragione dell'"intersezione" dei raggi.
 Un po' come fanno gli aerei supersonici, si genera un cono di onde d'urto.
 Questa somma coerente di piccoli contributi originati in posizioni e tempi diversi, dà origine a un fronte d'onda coerente.
 Non c'è nessuna violazione della teoria della relatività in questo processo: la velocità limite è quella della luce nel vuoto, che è più alta e non viene superata!

usata
che
lla luce

Effetto Cherenkov

$$v < \frac{c}{n}$$

$$v > \frac{c}{n}$$

$$\beta_t \equiv \frac{v_t}{c} = \frac{1}{n}$$

Al crescere della energia (e quindi della velocità) della carica irraggiante (al solito, un elettrone o un positrone sono esempi perfetti), l'angolo si allarga fino a superare i 40° per particelle che rasentano c

L'indice di rifrazione dell'aria è molto prossimo a 1

L'angolo di emissione theta è dato da: cos(theta) = 1/(beta*n).
 Al transito degli elettroni energetici i
 Questa è la ragione dell'"intensezione" dei
 Un po' come fanno gli aerei supersonici,
 Questa somma coerente di piccoli
 contributi originati in posizioni e tempi

Non c'è nessuna violazione della teoria della relatività in questo processo: la velocità limite è quella della luce nel vuoto, che è più alta e non viene superata!

che
 la luce

Effetto Cherenkov

$$v < \frac{c}{n}$$

$$v > \frac{c}{n}$$

$$\beta_t \equiv \frac{v_t}{c} = \frac{1}{n}$$

Al crescere della energia (e quindi della velocità) della carica irraggiante (al solito, un elettrone o un positrone sono esempi perfetti), l'angolo si allarga fino a superare i 40° per particelle che rasentano c

Questo implica che la soglia per essere "superluminale" è molto prossima alla velocità della luce nel vuoto dato che c/n e c differiscono pochissimo

Al transito degli elettroni energetici i
 Questa è la ragione dell'"intersezione" dei
 Un po' come fanno gli aerei supersonici,
 Questa somma coerente di piccoli
 contributi originati in posizioni e tempi
 Non c'è nessuna violazione della teoria della
 relatività in questo processo: la velocità
 limite è quella della luce nel vuoto, che è
 più alta e non viene superata!

lla luce

Effetto Cherenkov

$$v < \frac{c}{n}$$

$$v > \frac{c}{n}$$

$$\beta_t \equiv \frac{v_t}{c} = \frac{1}{n}$$

Al crescere della energia (e quindi della velocità) della carica irraggiante (al solito, un elettrone o un positrone sono esempi perfetti), l'angolo si allarga fino a superare i 40° per particelle che rasentano c

Al transito degli elettroni energetici i
Questa è la regione dell'"intersezione" dei
Un po' come fanno gli aerei supersonici,

Questa somma coerente di piccoli
contributi originati in posizioni e tempi

Non c'è nessuna violazione della teoria della
relatività in questo processo: la velocità
limite è quella della luce nel vuoto, che è
più alta e non viene superata!

Questo implica che la soglia non essere
L'indice di rifrazione vicino a uno, implica
anche che, in aria, il cono Cherenkov è
molto stretto (apertura ~1°) attorno alla
direzione di volo dell'elettrone.

la luce

Effetto Cherenkov

$$v < \frac{c}{n}$$

$$v > \frac{c}{n}$$

$$\beta_t \equiv \frac{v_t}{c} = \frac{1}{n}$$

Al crescere della energia (e quindi della velocità) della carica irraggiante (al solito, un elettrone o un positrone sono esempi perfetti), l'angolo si allarga fino a superare i 40° per particelle che rasentano c

Al transito degli elettroni energetici i
Questa è la ragione dell'"intersezione" dei
Un po' come fanno gli aerei supersonici,

Questa somma coerente di piccoli
contributi originati in posizioni e tempi

Non c'è nessuna violazione della teoria della
relatività in questo processo: la velocità
limite è quella della luce nel vuoto, che è
più alta e non viene superata!

Questo implica che la soglia per essere
Assumendo la densità dell'atmosfera al
livello del mare (giusto per avere un'idea)
basta un energia totale di 20 MeV per
avere un elettrone superluminale, che
quindi irraggia per effetto Cherenkov
entro un cono con apertura di poco più di 1°

Simulazione di sciami

Protone

Fotone

Rivelazione di un fotone

Tratto da: http://www.youtube.com/watch?v=noUyK-w9_DA

Giacomo Bonoli, INAF-OA Brera - "Cherenkov Telescope Array: cento nuovi occhi per scrutare il cielo" - "I Cieli di Brera", 15 Ottobre 2014 - Istituto Lombardo, Sala delle Adunanze - Milano, Palazzo Brera

Rivelazione IACT

Rivelazione IACT

Isolare la luce
degli sciami dal
fondo cielo

Rivelazione IACT

Isolare la luce
degli sciami dal
fondo cielo

Rivelazione IACT

Isolare la luce
degli sciami dal
fondo cielo

Rivelazione IACT

Isolare la luce
degli sciami dal
fondo cielo

Distinguere i
fotoni dagli
adroni e dai muoni

Rivelazione IACT

Isolare la luce degli sciami dal fondo cielo

Distinguere i fotoni dagli adroni e dai muoni

Rivelazione IACT

Isolare la luce degli sciami dal fondo cielo

Ricostruire direzione di volo (posizione)

Distinguere i fotoni dagli adroni e dai muoni

Rivelazione IACT

Isolare la luce degli sciami dal fondo cielo

Ricostruire direzione di volo (posizione)

Ricostruire energia (spettro d'energia)

Distinguere i fotoni dagli adroni e dai muoni

Astronomia TeV con Telescopi Cherenkov

- Telescopi MAGIC (2 x 17 m) @ Roque de los Muchachos (La Palma, Canari)
- Sensibili dai 30 GeV ai 50 TeV
- Flussi minimi rivelabili: $\sim 1/100$ del flusso della Crab Nebula in 50h
- risoluzione angolare 0.1° (in ottico, raggi X, siamo sotto il secondo d'arco, circa 500 volte meglio)

A caccia di Gamma Ray Bursts

<http://app.uni-dortmund.de/~backes/media/MAGICmovements.m1v>

<http://app.uni-dortmund.de/~backes/media/MAGICmovementsII.m1v>

**I MAGIC riescono a cambiare puntamento in 20"!!!
65 tonnellate di massa mobile**

Telescopi IACT in attività

MAGIC

VERITAS

2 - 4 Telescopes*
500-1000 pixel cameras*
3.5 - 5.0° FoV
~0.1° angular res.
~15% energy res.

HESS

CANGAROO III

*Pre Upgrades

Il cielo VHE

<http://tevcat.uchicago.edu>

Sorgenti gamma

Galattiche

- Resti di Supernova
- Pulsar Wind Nebulae
- Binarie a raggi X / micro-quasar
- Pulsar

Extra-Galattiche

- Blazar e radiogalassie
- Gamma ray bursts
- Galassie "starburst"
- Dark Matter (?)

Processi radiativi

Bremsstrahlung
(frenamento)

Sincrotrone

Compton inverso

non stelle, non galassie...

non stelle, non galassie...

Righe spostate verso il rosso ->
 Grande distanza -> enorme luminosità
 Righe allargate -> gas in moto rapido
 Variabilità rapida -> dimensioni compatte
 Un motore estremamente efficiente!

Motore centrale dei Nuclei Galattici Attivi (AGN)

Modello unificato

Blazars: getto visto in asse

Getti relativistici da Nuclei Galattici Attivi (AGN)

Binarie X / μ -quasars

L'analogo in miniatura: un oggetto compatto di massa stellare cannibalizza la stella compagna

Distribuzione spettrale di energia per il blazar Mrk 421

Distribuzione spettrale di energia per il blazar Mrk 421

Brillamenti intensi e rapidi

Assorbimento dei raggi gamma

Produzione di coppie particella antiparticella
E' l'inversa della annichilazione

Fondo diffuso extra-galattico

L'universo contiene ovunque
fotoni bersaglio

Polvere nell'
infrarosso lontano

Stelle nel visibile e
vicino infrarosso

Propagazione dei fotoni ($E > 100$ GeV)

Propagazione dei fotoni ($E > 100$ GeV)

L'osservazione dei blazar nella banda VHE permette misura del fondo infrarosso: importante per l'evoluzione delle galassie e la cosmologia

Fondo diffuso extra-galattico

Energia

100 GeV 1 TeV 10 TeV

Dominguez-Diaz et al. 2010

Fondo diffuso extra-galattico

Energia

100 GeV 1 TeV 10 TeV

Dominguez-Diaz et al. 2010

L'assorbimento produce un orizzonte oltre cui non vedo i fotoni VHE

Un Universo troppo trasparente?

3C 279 a $z=0.536$ segnale fino a
600 GeV

Molti altri blazar hanno uno spettro
TeV troppo intenso se correggiamo
la radiazione che vediamo con
l'assorbimento che ci aspettiamo:

sovrastimiamo il fondo EBL?

Oscillazioni fotone-assione?

Assioni e particelle Axion-like (ALP)

ALP interagiscono a 2 fotoni

"La luce che attraversa i muri"

ALPS@DESY (Hamburg)

Il sole come sorgente di ALP

Fotoni convertiti in ALP

Attraversamento del muro

Riconversione in fotoni X

~ 8 keV (dipende dal campo magnetico)

CAST@CERN

"Assionoscopio"

Illuminare al di là dal muro...

Illuminare al di là dal muro...

Alternativa: trasparenza anomala da violazioni dell'invarianza di Lorentz (QG)

Il futuro: Cherenkov Telescope Array

Il metodo

Il metodo

Il metodo

L'appetito vien mangiando...

L'appetito vien mangiando...

Per interessare tutti i 4 telescopi lo sciame
deve puntare alla zona gialla
la maggior parte degli sciame non lo fa!

L'appetito vien mangiando...

Per interessare tutti i 4 telescopi lo sciame
deve puntare alla zona gialla
la maggior parte degli sciame non lo fa!

L'appetito vien mangiando...

Per interessare tutti i 4 telescopi lo sciame deve puntare alla zona gialla
la maggior parte degli sciame non lo fa!

molti telescopi, grande area
più immagini per ogni sciame
soglia energetica bassa

Ricostruzione stereo

L'intersezione degli assi delle ellissi sulla volta celeste
posiziona accuratamente la sorgente

L'intersezione delle proiezioni al suolo degli assi così
 come li vede ciascun "occhio" individua con precisione
 il parametro d'impatto dello sciame. Questo è
 determinante per **ricostruire correttamente**
l'energia del fotone primario

Cosa uno vorrebbe:

Cosa uno vorrebbe:

Prestazione limitata solo dalle fluttuazioni statistiche nello sviluppo dei singoli sciami

risoluzione angolare $25'' @ 1 \text{ TeV}$

$7'' @ 10 \text{ TeV}$

Cosa potremo permetterci:

(una) configurazione possibile⁵⁴

Sito Australe, 100 M€ (prezzi 2006)

Basse energie:

4 x 23 m tel. (LST)

- parabolici

- FOV: 4-5°

soglia a 10-20 GeV

(una) configurazione possibile⁵⁴

Sito Australe, 100 M€ (prezzi 2006)

Basse energie:

4 x 23 m tel. (LST)

- parabolici

- FOV: 4-5°

soglia a 10-20 GeV

Energie Medie:

23 x 12 m tel. (MST)

FOV: 7-8°

sensibile a 0.1% di Crab

tra 100 GeV e 10 TeV

(una) configurazione possibile⁵⁴

Sito Australe, 100 M€ (prezzi 2006)

Basse energie:

4 x 23 m tel. (LST)

- parabolici

- FOV: 4-5°

soglia a 10-20 GeV

Energie Medie:

23 x 12 m tel. (MST)

FOV: 7-8°

sensibile a 0.1% di Crab
tra 100 GeV e 10 TeV

Altissime energie:

30-70 x 4-6 m tel. (SST)

- FOV: ~10°

-10 km² area sopra 5 TeV

Curva di Sensibilità

Sensibilità a flussi dell'ordine di 1/1000 del flusso della Crab Nebula
Possibile osservare sorgenti ~ 10 volte più deboli dei telescopi attuali!!

Curva di Sensibilità

Sensibilità a flussi dell'ordine di 1/1000 del flusso della Crab Nebula
Possibile osservare sorgenti ~ 10 volte più deboli dei telescopi attuali!!

Curva di Sensibilità

Sensibilità a flussi dell'ordine di 1/1000 del flusso della Crab Nebula
Possibile osservare sorgenti ~ 10 volte più deboli dei telescopi attuali!!

Curva di Sensibilità

Sensibilità a flussi dell'ordine di 1/1000 del flusso della Crab Nebula
 Possibile osservare sorgenti ~ 10 volte più deboli dei telescopi attuali!!

~ 70 anni dopo....

1953

CTA come OSSERVATORIO, non
PIU' ESPERIMENTO

Membrri CTA: 29 Paesi

Argentina, Armenia, Austria, Brazil, Bulgaria, Czech Republic, Croatia, Finland, France, Germany, Greece, India, **Italy**, Ireland, Japan, Namibia, Netherlands, Norway, Poland, Slovenia, Spain, South Africa, Sweden, Switzerland, UK, USA

Dove **COSTRUIRLO?**

Siti candidati

L'Italia (e OAB) in CTA: il progetto ASTRI

Il progetto ASTRI

Principal Investigator **G. Pareschi**

Co-PIs O. Catalano & S. Vercellone

Program Manager M. Fiorini

System Engineer L. Stringhetti

INAF/CTA Responsible P. Caraveo

INAF Institutions

IASF Milano

IASF Bologna

IASF Palermo

INAF HQ Roma

OA Brera

OA Torino

OA Padova

OA Bologna

OA Arcetri

OA Roma

OA Capodimonte

OA Catania

University Partners

Univ. of Padova

Univ. of Perugia

Il progetto ASTRI

Principal Investigator G. Pareschi

Co-PIs O. Catalano & S. Vercellone

Program Manager M. Fiorini

System Engineer L. Stringhetti

INAF/CTA Responsible P. Caraveo

INAF Institutions

IASF Milano

IASF Bologna

IASF Palermo

INAF HQ Roma

OA Brera

OA Torino

OA Padova

OA Bologna

OA Arcetri

OA Roma

OA Capodimonte

OA Catania

University Partners

Univ. of Padova

Univ. of Perugia

Il progetto ASTRI

Principal Investigator G. Pareschi

Co-PIs O. Catalano & S. Vercellone

Program Manager M. Fiorini

System Engineer L. Stringhetti

INAF/CTA Responsible P. Caraveo

INAF Institutions

IASF Milano

IASF Bologna

IASF Palermo

INAF HQ Roma

OA Brera

OA Torino

OA Padova

OA Bologna

OA Arcetri

OA Roma

OA Capodimonte

OA Catania

University Partners

Univ. of Padova

Univ. of Perugia

ASTRI SST-2M **concept**:
doppio specchio
(Schwarzschild-Couder)
grande campo (9.6°) con PSF
costante

Il progetto ASTRI

Principal Investigator G. Pareschi

Co-PIs O. Catalano & S. Vercellone

Program Manager M. Fiorini

System Engineer L. Stringhetti

INAF/CTA Responsible P. Caraveo

INAF Institutions

IASF Milano

IASF Bologna

IASF Palermo

INAF HQ Roma

OA Brera

OA Torino

OA Padova

OA Bologna

OA Arcetri

OA Roma

OA Capodimonte

OA Catania

University Partners

Univ. of Padova

Univ. of Perugia

ASTRI SST-2M **concept**:

doppio specchio

(Schwarzschild-Couder)

grande campo (9.6°) con PSF

costante

camera leggera (~ 50 kg) e

compatta ($\sim 50 \times 50 \times 50$ cm³)

con sensori Si-PM

Il progetto ASTRI

Principal Investigator G. Pareschi

Co-PIs O. Catalano & S. Vercellone

Program Manager M. Fiorini

System Engineer L. Stringhetti

INAF/CTA Responsible P. Caraveo

INAF Institutions

IASF Milano

IASF Bologna

IASF Palermo

INAF HQ Roma

OA Brera

OA Torino

OA Padova

OA Bologna

OA Arcetri

OA Roma

OA Capodimonte

OA Catania

University Partners

Univ. of Padova

Univ. of Perugia

ASTRI SST-2M **concept**:
doppio specchio
(Schwarzschild-Couder)
grande campo (9.6°) con PSF
costante

camera leggera (~ 50 kg) e
compatta ($\sim 50 \times 50 \times 50$ cm³)
con sensori Si-PM

Il sito osservativo

INAF - Osservatorio Astrofisico di Catania

Sede osservativa "M. G. Fracastoro" - Serra La Nave (Mt. Etna)

Altitudine: 1735 m

Longitudine: +14° 58'.4; Latitudine +37° 41'.5

ASTRI SST-2M: gli specchi

Specchio secondario (M2)

Monolitico

3 attuatori: tip-tilt e pistone per allineamento e messa a fuoco

ASTRI SST-2M: lo specchio primario

- curvatura ottenuta "a freddo"
- deposito riflettente multistrato per privilegiare la banda dall'UV al blu (dove è intenso il segnale Cherenkov) rispetto a quella rossa (dove è intenso il disturbo dato dalla luce di fondo cielo).

Triangolo di supporto, con 2 attuatori, punto fisso, vincolo tangenziale, sistema di allineamento

ASTRI SST-2M: lo specchio secondario

Prototipo in scala della struttura in nido d'ape d'alluminio per il secondario di ASTRI

Disegno tridimensionale CAD del sistema di supporto e allineamento del secondario

ASTRI SST-2M: lo specchio secondario

sistema di
secondario

ASTRI SST-2M: lo specchio secondario

ASTRI SST-2M: lo specchio secondario

ASTRI SST-2M: Sensori innovativi

Superficie focale di ASTRI SST-2M
37 PDMs
Diametro del campo di vista: 9.6°

1 Photon Detection Module
(PDM) = 4x4 Unità

1 Unità
4x4 pixel
1px = 3mm x 3mm

ASTRI SST-2M: Sensori innovativi

24 Settembre 2014

Giacomo Bonnoli, INAF-OA Brera - "*Cherenkov Telescope Array: cento nuovi occhi per scrutare il cielo*" - "**I Cieli di Brera**", 15 Ottobre 2014 - Istituto Lombardo, Sala delle Adunanze - Milano, Palazzo Brera

24 Settembre 2014

Giacomo Bonnoli, INAF-OA Brera - "Cherenkov Telescope Array: cento nuovi occhi per scrutare il cielo" - "I Cieli di Brera", 15 Ottobre 2014 - Istituto Lombardo, Sala delle Adunanze - Milano, Palazzo Brera

24 Settembre 2014

Giacomo Bonnoli, INAF-OA Brera - "Cherenkov Telescope Array: cento nuovi occhi per scrutare il cielo" - "I Cieli di Brera", 15 Ottobre 2014 - Istituto Lombardo, Sala delle Adunanze - Milano, Palazzo Brera

24 Settembre 2014

Giacomo Bonnoli, INAF-OA Brera - "Cherenkov Telescope Array: cento nuovi occhi per scrutare il cielo" - "I Cieli di Brera", 15 Ottobre 2014 - Istituto Lombardo, Sala delle Adunanze - Milano, Palazzo Brera

24 Settembre 2014

Giacomo Bonnoli, INAF-OA Brera - "Cherenkov Telescope Array: cento nuovi occhi per scrutare il cielo" - "I Cieli di Brera", 15 Ottobre 2014 - Istituto Lombardo, Sala delle Adunanze - Milano, Palazzo Brera

24 Settembre 2014

Giacomo Bonnoli, INAF-OA Brera - "Cherenkov Telescope Array: cento nuovi occhi per scrutare il cielo" - "I Cieli di Brera", 15 Ottobre 2014 - Istituto Lombardo, Sala delle Adunanze - Milano, Palazzo Brera

Il sito osservativo

INAF - Osservatorio Astrofisico di Catania

Sede osservativa "M. G. Fracastoro" - Serra La Nave (Mt. Etna)

Altitudine: 1735 m

Longitudine: +14° 58'.4; Latitudine +37° 41'.5

Il sito osservativo

INAF - Osservatorio Astrofisico di Catania

Sede osservativa "M. G. Fracastoro" - Serra La Nave (Mt. Etna)

Altitudine: 1735 m

Longitudine: +14° 58'.4; Latitudine +37° 41'.5

ASTRI SST-2M: il primo di molti

L'obiettivo è installare ed utilizzare un array ridotto, con **7-9** telescopi **ASTRI SST-2M** al sito finale di CTA-South

Un concetto piuttosto antico...

Dall'ASTRI Mini-Array al CTA-South

Dall'ASTRI Mini-Array al CTA-South

Dall'ASTRI Mini-Array al CTA-South

Dall'ASTRI Mini-Array al CTA-South

Dall'ASTRI Mini-Array al CTA-South

Dall'ASTRI Mini-Array al CTA-South

L'ASTRI Mini-Array rappresenterà il nucleo base attorno a cui si formerà l'intero sito Sud del Cherenkov Telescope Array

Giacomo Bonnoli, INAF-OA Brera - "Cherenkov Telescope Array: cento nuovi occhi per scrutare il cielo" - "I Cieli di Brera", 15 Ottobre 2014 - Istituto Lombardo, Sala delle Adunanze - Milano, Palazzo Brera

Per concludere

- Non solo stelle, pianeti e gas nell'Universo, ma **un assortito bestiario di violentissimi mostri!**
- La Natura ogni giorno più affascinante: **motori ben più efficienti delle reazioni nucleari!**
- Acceleratori di particelle **naturali** milioni di volte più potenti dei massimi costruibili dall'uomo (ad. es. LHC): potrebbero svelarci fenomeni di fisica fondamentale difficili o impossibili da riprodurre nei nostri laboratori. Interesse per la **fisica delle particelle elementari** (**Materia Oscura**, **particelle "axion-like"**) la **cosmologia** (il **fondo infrarosso**, il **campo magnetico intergalattico**) la **fisica dei plasmi**.
- La dura impresa intellettuale di **comprendere come funziona una macchina complessa come un blazar** potendo solo far misure su un misterioso puntino luminoso lontanissimo! O quella di **ricostruire energia e direzione dei fotoni gamma** osservando i **deboli e rapidissimi flash Cherenkov...** L'essere umano che si sforza di superare i propri limiti, con qualche brillante successo!
- **Consistenti sviluppi tecnologici** trasferibili su molti altri campi **apparentemente non connessi e lontanissimi**; che implicano a loro volta **tanta fisica raffinata**.
- **L'Italia (e INAF, e OAB, ma anche le nostre industrie ad alta tecnologia) al passo dei migliori ... e talvolta anche un pelino avanti!**

"That's all Folks!"

Grazie!!