Istituto Nazionale di Astrofisica
Osservatorio astronomico di Brera

Universo in fiore
Introduzione all'astronomia

Ilaria Arosio

Ilaria.ariosio@brera.inaf.it

INAF-Osservatorio Astronomico di Brera

9 ottobre 2013

Fondato intorno al 1762,
l'OAB è la più antica istituzione di ricerca scientifica di Milano

Subaru – Giappone
Ø 8,2 m

Hawaii

Keck I & II
Ø 10 m

05 05 2000

Cosa fa un astronomo?

Cosa fa un astronomo?

FLATRON wide

Windows desktop environment with multiple open applications:

- Top Left:** A window titled "M2sum.fits[UVW2]" showing a dark astronomical image with green concentric circles overlaid, representing a radial profile analysis.
- Top Right:** A dialog box titled "Annulus" with parameters: Number 1, Text, Center (4:09:52.035, -56:07:03.24), Radius (Inner: 0, Outer: 180), and Annuli (17).
- Middle Right:** A plot window titled "Radial Profile Plot (annulus regions: none) <->" showing a graph of surface brightness vs. radius. The y-axis is labeled "surf_brightness(arcsec^-2)" and the x-axis is "avg_radius(arcsecs)".
- Bottom Left:** An email client window showing a message from Gianpiero Tagliaferri with the subject "esito proposal su Tempo Italiano Swift".
- Bottom Right:** A taskbar with various application icons and a system tray.

LG

Proprietà della radiazione elettromagnetica

Schema 1
LUNGHEZZA D'ONDA

log lunghezza d'onda (m)
log frequenza (Hz)

Terra, Milano, 130m

FOV 111°

106 FPS

2012-12-05 22:58:48

HUBBLE ULTRA DEEP FIELD (HUDF)

Hubble Ultra Deep Field:

Angolo di cielo grande quanto un decimo della luna piena

Hubble Ultra Deep Field:

Angolo di cielo grande quanto un decimo della luna piena

*Ogni singolo punto luminoso in questo angolo di cielo
(ad eccezione di due sole stelle) è una galassia.*

*“Attraverso lo spazio, l’universo mi circonda e mi
inghiotte come un punto;
con il pensiero, io lo comprendo”*

Blaise Pascal

SISTEMA PLANETARIO

Anno luce:

la distanza che la luce percorre in un anno

$$V = \frac{s}{t}$$

$$Vt = s$$

$$300.000 \text{ Km/s} \cdot 365 \text{ g} \cdot 24 \text{ h} \cdot 60 \text{ m} \cdot 60 \text{ s} = 9,4 \cdot 10^{12} \text{ Km}$$

$$1 \text{ anno luce} \approx 9.400.000.000.000 \cdot \text{Km}$$

Se devo dire *dove* sono
(in termini di coordinate celesti)
non mi importa molto della distanza
ma se devo dire come sono sì...

Perché è importante il concetto
di distanza?

L'astrofisica

è quella branca dell'astronomia o della fisica che studia le proprietà fisiche, ovvero tutti i vari fenomeni, della materia celeste.

La materia è composta da:

																	Noble gases ↓ 18 8A		
		Alkaline earth metals ↓																	Halogens ↓ 17 7A
1A	2A											3A	4A	5A	6A	7A	8A		
1 H	2 He											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne		
3 Li	4 Be	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar		
		Transition metals																	
Alkali metals	11 Na	12 Mg	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr	
	19 K	20 Ca	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe	
	37 Rb	38 Sr	57 La*	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn	
	55 Cs	56 Ba	89 Ac†	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Uun	111 Uuu	112 Uub							
	87 Fr	88 Ra																	

*Lanthanides

58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

†Actinides

90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr
----------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Alkaline earth metals												Noble gases					
1 1A	2 2A											18 8A					
1 H												13 3A	14 4A	15 5A	16 6A	17 7A	18 8A
3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
11 Na	12 Mg	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
Alkali metals		21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
19 K	20 Ca																
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
55 Cs	56 Ba	57 La*	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
87 Fr	88 Ra	89 Ac†	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Uun	111 Uuu	112 Uub						

*Lanthanides	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho
†Actinides	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es

PINK
FLOYD
THE
DARK SIDE
OF THE
MOON

SPETTROSCOPIO

GAS CALDO E DENSO

sorgente
di
luce
bianca

schermo

schermo

$T = 12,000 \text{ K}$

$\lambda_m \approx 250 \text{ nm}$

$T = 6000 \text{ K}$

$\lambda_m \approx 500 \text{ nm}$

$T = 3000 \text{ K}$

$\lambda_m \approx 1000 \text{ nm}$

Brightness ↑

La classificazione delle stelle

Colore	Temperatura	categoria	<i>filastrocca</i>
blu intenso	40 000	O	<i>oh</i>
blu	28 000	B	<i>be</i>
blu-bianco	9 900	A	<i>a</i>
bianco	7 400	F	<i>fine</i>
giallo	6 030	G	<i>girl</i>
arancione	4 900	K	<i>kiss</i>
rosso arancio	3 480	M	<i>me</i>
rosso	3 000	R,N,S

SPETTROSCOPIO

LAMPADA
A GAS RAREFATTO

Nel 1859 Robert Wilhelm Bunsen e Gustav Robert Kirchhoff misero a punto il primo spettroscopio, uno strumento estremamente utile nella ricerca e nel riconoscimento di nuovi elementi.

Nel 1860 gli stessi Bunsen e Kirchhoff identificarono il cesio e il rubidio dalle linee di emissione dei loro spettri atomici. Gli elementi presero il nome dal colore delle linee, rispettivamente celesti e rosse.

Il tallio e l'indio, il gallio e i gas nobili vennero riconosciuti grazie alle linee di emissione.

Per esempio l'elio fu rilevato nella corona solare nel 1868 prima ancora che sulla Terra.

SPETTROSCOPIO

LAMPADA
A GAS RAREFATTO

Nel 1859 Robert Wilhelm Bunsen e Gustav Robert Kirchhoff misero a punto il primo spettroscopio, uno strumento estremamente utile nella ricerca e nel riconoscimento di nuovi elementi.

Nel 1860 gli stessi Bunsen e Kirchhoff identificarono il cesio e il rubidio dalle linee di emissione dei loro spettri atomici. Gli elementi presero il nome dal colore delle linee, rispettivamente celesti e rosse.

Il tallio e l'indio, il gallio e i gas nobili vennero riconosciuti grazie alle linee di emissione.

Per esempio l'elio fu rilevato nella corona solare nel 1868 prima ancora che sulla Terra.

SPETTROSCOPIO

*GAS
RAREFATTO
FREDDO*

GAS CALDO E DENSO

spettro tipico	temperatura alla superficie delle stelle	atomi produttori le principali righe spettrali	grandezza assoluta	colore della radiazione principale	stelle di questo tipo
O da 35.000 a 40.000 °C	elio ionizzato idrogeno neutro elio ordinario	-6,5		λ di Cefeo
B da 11.000 a 35.000 °C	elio neutro silicio, magnesio ossigeno, azoto idrogeno neutro	-5 2		η di Orione Altair
A da 7.500 a 11.000 °C	metalli (specialmente calcio) che danno righe deboli, idrogeno (righe molto forti)	1,3 -0,5		Sirio Vega
F da 6.000 a 7.500 °C	metalli (specialmente calcio) che danno righe forti idrogeno (righe deboli)	3		Procione
G da 5.100 a 6.000 °C	potassio (righe forti) metalli neutri (righe forti) idrogeno (righe molto deboli)	5 -0,5		Sole Capella
K da 3.500 a 5.100 °C	metalli neutri (righe forti) idrogeno (righe molto deboli)	0 8		Arturo 61 del Cigno
M da 2.000 a 3.500 °C	molecole di ossido di titanio (righe forti)	-5 -4 12 o 13		Betelgeuse Antares e molte altre

Spectra of ordinary stars

NGC 2903

La spettroscopia
studia la distribuzione luce alle varie lunghezze d'onda

Negli spettri ci sono spesso righe di emissione

Radiazione prodotta da transizioni elettroniche all'interno degli atomi

<https://www.youtube.com/watch?v=JURwVDpJz6k>

Gran premio di Formula 1

<http://www.youtube.com/watch?v=9ZIZQhgsENQ>

Effetto Doppler

Se una sorgente luminosa si avvicina le lunghezze d'onda della radiazione diminuiscono

BLUE SHIFT

Se una sorgente luminosa si allontana le lunghezze d'onda della radiazione aumentano

REDSHIFT

Sorgente “a riposo”

Effetto Doppler – sorgente in allontanamento

Effetto Doppler – sorgente in allontanamento

le righe si spostano quindi verso il rosso: **redshift**

Effetto Doppler

(non relativistico)

$$\frac{\lambda_0 - \lambda}{\lambda_0} = \frac{v_s}{c} \approx z$$

*«Equipaggiato dei suoi cinque sensi, l'uomo esplora l'universo attorno a lui
e chiama l'avventura Scienza.»*

Edwin Hubble

A deep space photograph showing a vast field of stars and galaxies. The background is dark, filled with numerous small, distant galaxies and stars. A prominent, bright yellow star is located in the upper right quadrant. In the lower left, there is a large, detailed image of a spiral galaxy with a bright core and distinct arms. Other galaxies of various shapes and sizes are scattered throughout the field. The text "Buona serata!" is written in a white, serif font at the top center, and "Ilaria Arosio" is written in a white, italicized serif font in the lower left area.

Buona serata!

Ilaria Arosio

A nighttime photograph of the Milan skyline. The Duomo di Milano is the central focus, brightly lit with warm yellow lights, showing its intricate Gothic architecture and spires. The surrounding city is dark, with some buildings and windows illuminated, creating a contrast with the dark sky. The foreground shows the silhouettes of trees and the dark outlines of buildings.

*Dobbiamo anche confidare un poco in ciò che
Galileo chiamava la cortesia della Natura,
in grazia della quale talvolta da parte inaspettata
sorge un raggio di luce ad illuminare
argomenti prima creduti inaccessibili alle
nostre speculazioni [...].*

Speriamo dunque.

E studiamo

G.V. Schiaparelli,
in *Il pianeta Marte*, 1893