Istituto Nazionale di Astrofisica

Osservatorio astronomico di Brera

Universo in fiore

Un'ora da astronomi: Studiare gli ammassi di galassie

Ginevra Trinchieri

ginevra.trinchieri@brera.inaf.it

INAF-Osservatorio Astronomico di Brera

22/11/2017

Un caso concreto: JKCS041

ammasso di galassie ad alto redshift:

dalla “scoperta”

alla “conferma”

alla “misura di distanza”

alla “conclusione” [fino a oggi !]:

massa, ricchezza, evoluzione ... caso cosmologico ...

**Brevissimo
ripasso**

Cosa fa oggi un/a astronomo/a? [teorici a parte]

Edwin Hubble at Palomar Observatory
(credit: Emilio Segre Visual Archives/AIP/SPL)

Edwin Hubble at the 100-inch Hoker Telescope
(Mt. Wilson Obs.)

Quantità per Astronomi

Si distinguono dagli altri !

1.

Base per Astronomi: SISTEMA cgs : cm, g, sec, erg [eV]

Altri: SISTEMA MKS : m, Kg, sec, J

ma mescolano anche altre unità: Å, K, mag

2.

Richiedono unità specifiche : AU, pc, $L_{\odot}$, $M_{\odot}$

però anche gli antichi avevano fatto così ... e lo facciamo ancora quotidianamente

3.

Misurano le stesse quantità in unità diverse [più o meno]

- *Energia e Temperatura: [K]ev, ν , λ , K;*
- *Luminosità in erg/s, erg/s/Hz, $L_{\odot}$, Magnitudini ($M_{\odot}$)*
- *Distanze in AU, Mpc, km/s, z, “epoca di formazione”*

Quantità fondamentali misurate

- Distanza : Mpc, Velocità (km/s) e redshift

Capire come sono distribuiti gli oggetti celesti nel cosmo:

Visione 3D

Arrivare alle quantità “intrinseche” partendo dalle
quantità apparenti: Luminosità ... Massa ... Dimensioni

Ricostruire la storia dell'Universo

Quantità fondamentali misurate

- Distanza : Mpc, Velocità (km/s) e redshift
- Luminosità (~potenza emessa):
unità solari $L_{\odot}$: $1 L_{\odot} = 4 \times 10^{33}$ erg/s

data da quantità misurabili: $L=4\pi d^2 \times f$

distanza e flusso = “conteggi [ccd]” * “fattore di conversione”

*** Si usano anche le magnitudini (tradizione astronomi ottici)

Il secolo a.C. Ipparco : classifica le stelle in 1^a - 6^a magnitudine/grandezza

~1857 Pogson $F_1/F_6 = 100$

la risposta dell'occhio ad una variazione di luminosità è logaritmica

$$M = m + 5 - 5 \log D$$

$$M_{bol\,stella} - M_{bol\,sole} = -2,5 \log_{10} \frac{L_{stella}}{L_{\odot}}$$

Quantità fondamentali misurate

- Distanza : Mpc, Velocità (km/s) e redshift
- Luminosità (~potenza emessa): unità solari $L_{\odot}$

$$1 L_{\odot} = 4 \times 10^{33} \text{ erg/s}$$

***magnitudini

$$M_{bol_{stella}} - M_{bol_{sole}} = -2,5 \log_{10} \frac{L_{stella}}{L_{\odot}}$$

- Massa: unità solari $M_{\odot}$

$$1 M_{\odot} = 2 \times 10^{33} \text{ g} \sim 344.000 \text{ volte la terra}$$

Si misura ad es. usando gli effetti della gravità (sistemi binari .. ammassi di galassie e materia oscura)

Ma come è fatto l'Universo?

Oggi : una ragnatela cosmica

Colori diversi per
Distanze diverse

1.6 milioni di galassie $D < 200 \text{ Mpc}$ ($z < 0.1$)

Credit: T.H. Jarrett/ IPAC/SSC

Ma come è fatto l'Universo?

“Ieri”: una ragnatela cosmica

~ 90000 galassie Colore riproduce il colore intrinseco vero della galassia e la cui dimensione è proporzionale alla sua luminosità.

Crediti: B. Granett & the VIPERS team + MediaINAF

In origine: CMB

Radiazione Cosmica di Fondo
380,000 anni dopo il Big Bang

COBE (1992) : 7°

WMAP (2003) : 0.3°
2.725 Kelvin $\pm$ 0.0002

Planck (2013) : 0.08° (5")
2.725 Kelvin $\pm$ 0.00005

Graphic by Adam Becker and Peter Aldhous

La struttura dell'Universo a larga scala

Ammassi di galassie

Sistemi di galassie gas e materia oscura legati gravitazionalmente.

Sistemi di galassie che

abbiano caratteristiche simili

[colore, morfologia, flusso/luminosità, età]

siano in una zona ben definita dello spazio 2-D / 3-D

[misura di Distanza e/o velocità]

siano a densità maggiore rispetto allo spazio circostante

[n^0/area n^0/Volume]

siano legate gravitazionalmente

[gas caldo, archi gravitazionali ...]

Ammassi di galassie

Si formano nei punti di incontro
dei filamenti

Sono importanti come traccianti della
materia nell'Universo

Sono importanti per studi cosmologici
[formazione dell'Universo]

Fino a dove [quando] si possono
riconoscere gli ammassi di galassie?

JKCS041 ... un caso interessante:
potrebbe essere un ammasso di galassie
a $z \sim 2$!
Come procediamo?

intorno al
2006 - 2007

JKCS041@ $z=1.80$

gz'K (BGR channels)

1. “scoperta” :

Ammasso di galassie identificato per

- eccesso di galassie
- vicine -- in una zona di cielo ristretta
- dello stesso “colore” [bande IR $\sim 1\mu\text{m}$]

CIOÈ?

se questo fosse il cielo ...
posso identificare subito un “ammasso”

5 persone “vicine”
con caratteristiche comuni
più “addensate” degli altri passanti
in uno spazio ben definito
legate da una conversazione

se questo fosse il cielo ...

cosa vedo?
cosa devo "vedere"
per "identificare" un
ammasso?

ora proviamo sul cielo

Ora togliamo tutto quello che non c'entra con l'ammasso della Vergine

rimangono
~780 galassie

Stessa distanza
-- colori
-- forme

DA DOVE SIAMO PARTITI?

→ Dati di archivio

Immagini in vari filtri ottenute con un programma proposto “da altri” analizzate, ripulite da problemi strumentali, calibrate

Dati “scientifici” sono resi disponibili attraverso un archivio.

L’archivio viene periodicamente aggiornato con nuovi dati e nuova pulizia/calibrazione dei dati già presenti

→ immagine combinazione di più filtri

JKCS041@ $z=1.80$

gz'K (BGR channels)

2009, A&A, 507, 147

Credit: Terapix/WIRDS/GHFT

PERCHÈ SONO IMPORTANTI I COLORI ?

identificano il “tipo”

NGC4889
E4

NGC3147
Sb

COME SI RICAVANO I COLORI ?

Stella Vega

Galassia Starburst
SDSS J161719.40-000455.1
Z~0.1

PERCHÈ SONO IMPORTANTI I COLORI ? STELLA ... GALASSIA

PERCHÈ SONO IMPORTANTI I COLORI ?

STELLA ... GALASSIA E ... GALASSIA S

SCELTA DEI FILTRI!

PERCHÈ SONO IMPORTANTI I COLORI ?

Cambiano
con z

La relazione colore-magnitudine nell'ammasso di Coma

La relazione colore-magnitudine ad alto redshift

Nella direzione
di JKCS041
pochi ...
ma buoni!

nella regione
di confronto
nessuno ...

JKCS041@ $z=1.80$

gz'K (BGR channels)

1. “scoperta” :

Alta densità di galassie dello stesso colore

2. “conferma” :

Misura di caratteristiche che definiscono l'ammasso, quali il tipo di galassie e l'evidenza della presenza di una buca di potenziale

CIOÈ?

L'Ammasso di COMA BERENICES

RICERCA DI GAS CALDO

➔ RICHIESTA DI OSSERVAZIONI NELLA BANDA X

Proposal for *Chandra* Observations Cycle 13
 Cover Page

Principal Investigator
 Dr. Ginevra Trinchieri **+ CO-I**
 Department/Mailstop

Institute
 IIAF-0A/Brera

Address / Street
 via Brera 28 City / Town
 Milano

State / Province Zip / Postal Code Country
 Italy

Telephone Fax
 +390272320327 +390272001600

E-Mail Address:
 ginevra.trinchieri@brera.inaf.it

Proposal Title
 X-ray emission and star formation history in Spitzer-selected ETGs

Subject Category
 NORMAL GALAXIES: DIFFUSE EMISSION

Proposal Type LP	Linked Proposal N	Distr. Medium WWW ONLY	Proprietary Rights S
Total Requested Time 530.00	Number of Targets 6	Number TOO Triggers	Proposed Budget
Multi-Cycle Proposal N	Requested Time Allocations		
	Cycle 13 530.00	Cycle 14 0.00	Cycle 15 0.00

Joint Proposal?

HST Orbits	HST Instruments:		
XMM Time	Spitzer Time	Suzaku Time	
NOAO Nights?	NOAO Telescope/Instruments:		
NRAO Hours	NRAO Telescopes		

Abstract
 We focus on a well selected sample of nearby elliptical galaxies for which we have a reliable determination of the star formation history from high S/N Spitzer and GALEX observations. We aim at determining the incidence and where possible the properties of the hot ISM in light of the detailed characteristics of their stellar population. Chosen galaxies are passively evolving systems, at most with a secondary episode of recent star formation. In light of current scenario we expect them to have a sizable hot ISM. We request high quality X-ray data to determine the amount and parameters of the hot ISM, such as luminosity, spatial distribution, temperature where possible, to explore whether even small perturbations in the star formation history can alter the hot gas content or properties.

Proposal Number Date: 2011-03-15 Admin. use only

PI Dr. Ginevra Trinchieri		Proposal Title X-ray emission and star formation history in Spitzer-selected ETGs									
Tar No	Target Name	(J2000)	Offsets	Optical	Obs.Time	Detector	(c/s)	Time-	Grid		
	Solar System Object		Y Detector	Monitor	(ksec)	Grating	Count Rate	Constr?			
	Grid Name	R.A.	Z Detector	V-Mag	Cycle 14	HRC	1st Order	Ext.Src?	#Points		
	Target Description (keywords)	Dec.	SIM Trans		Cycle 15	Timing	Total Fld.	TOO?	MaxDist.		
1	NGC 7192	22 06 50.1		N	100.00	ACIS-S	0.050000	N	N		
	NONE	-64 18 58.0				NONE		Y			
	ELLIPTICAL GALAXIES										

GIUSTIFICAZIONE SCIENTIFICA [4+ pagine di testo]

- Contesto
- obiettivi specifici
- risultati attesi
- specifiche dell'osservazione

Emissione X misurata con Chandra

1. “scoperta” :

Alta densità di galassie dello stesso colore

2. “conferma” :

Evidenza della presenza di un mezzo intergalattico caldo

3. “misura” :

distanza → quantità intrinseche : Massa, Luminosità, dimensioni

....

CIOÈ?

Animazione con audio che illustra il metodo con il quale è stata calcolata la distanza di JKCS041 in attesa di avere una misura del red-shift

<https://youtu.be/WVlxtCrFGA>

Crediti: INAF/S. Andreon/M. Malaspina

MISURA DELLA DISTANZA:

→ RICHIESTA DI OSSERVAZIONI PER SPETTRI [VLT/LBT]
IMMAGINI E SPETTRI [HST]

FORM TECNICA

- proponente + Col e altri dettagli
- strumento/tempo di osservazione
- target

GIUSTIFICAZIONE SCIENTIFICA

- Contesto
- obiettivi specifici
- risultati attesi
- specifiche dell'osservazione

Dalla scoperta alla conferma: hanno tutte lo stesso z [dati HST]

Spettri delle galassie dell'ammasso misure da HST

Due Galassie n. 531 e 322 hanno righe di emissione [Ossigeno] ben chiare a $z=1.80$ → galassie “starforming”

Una galassia 355 ha una discontinuità “4000 Å break” → galassia ellittica

Studiamo la terza dimensione con HST

Totale di 19 galassie con red-shift misurato $z=1.803$

La relazione colore-magnitudine con HST e con info sul red-shift

1. “scoperta” :

Alta densità di galassie dello stesso colore

2. “conferma” :

Evidenza della presenza di un mezzo intergalattico caldo

3. “misura” :

distanza $z=1.803$

“conclusioni” :

COMA BERENICES @ $z=0$
universo locale
eta' universo ~ 14 Gy

JKCS041 @ $z=1.8$
universo distante
eta' universo ~ 3 Gy

A&A 565, A120 (2014)
DOI: 10.1051/0004-6361/201323077
© ESO 2014

Astronomy
&
Astrophysics

JKCS 041: a Coma cluster progenitor at $z = 1.803$

S. Andreon¹, A. B. Newman^{2,3}, G. Trinchieri¹, A. Raichoor^{1,4}, R. S. Ellis², and T. Treu⁵

stesse caratteristiche!!!!

Quindi?

Siamo a posto con la teoria ?

*JKCS041 ha le caratteristiche tipiche
dell'universo locale [~ 14 Gyr]*

*è presto [~ 3 Gyr] per questo tipo di struttura :
troppo presto?*

È un oggetto unico?

**NON ESATTAMENTE UN'ORA
...QUALCHE ANNO.
E CERTAMENTE LA RICERCA VA
ANCORA AVANTI**

2006-
2007

Proposta Chandra → pubblicazione

2009

....

2011-
2012

Proposta HST → pubblicazioni

2014

....

Proposte IRAM ... approvata

2017

Altre osservazioni di altri gruppi

... ???

**E TRA UN SUCCESSO E L'ALTRO,
MOLTE ALTRE PROPOSTE DI OSSERVAZIONE ...**

inizio
2006-
2007

Proposal for *Chandra* Observations
Cover Page

Cycle 09

**Astronomy
&
Astrophysics**

2009

A&A 507, 147–157 (2009)
DOI: 10.1051/0004-6361/200912299
© ESO 2009

JKCS 041: a colour-detected galaxy cluster at $z_{\text{phot}} \sim 1.9$ with deep potential well as confirmed by X-ray data

S. Andreon¹, B. Maughan², G. Trinchieri¹, and J. Kurk³

¹ INAF – Osservatorio Astronomico di Brera, via Brera 28, 20121 Milano, Italy
e-mail: stefano.andreon@brera.inaf.it

² Department of Physics, University of Durham, Leazes Road, Durham, UK
doi:10.1111/j.1365-2966.2010.18662.x

Red sequence determination of the redshift of the cluster of galaxies JKCS 041: $z \sim 2.2$

S. Andreon¹ and M. Hübner^{2,3}

¹ Osservatorio Astronomico di Brera, via Brera 28, 20121 Milano, Italy
² Institut d'Astronomie et d'Astrophysique, Université de Genève, CH-1205 Genève, Switzerland
³ Institut für Astronomie und Astrophysik, Universität Wien, 1180 Wien, Austria

**Astronomy
&
Astrophysics**

2011

Astronomy & Astrophysics manuscript no. draft v1
March 23, 2011

© ESO 2011

LETTER TO THE EDITOR

The extreme synchronicity of stellar ages of red galaxies in the JKCS 041 cluster at $z = 2.2$

S. Andreon

Osservatorio Astronomico di Brera, via Brera 28, 20121, Milano, Italy
e-mail: stefano.andreon@brera.inaf.it

**Astronomy
&
Astrophysics**

2014

A&A 565, A120 (2014)
DOI: 10.1051/0004-6361/201323077
© ESO 2014

JKCS 041: a Coma cluster progenitor at $z = 1.803$

S. Andreon¹, A. B. Newman^{2,3}, G. Trinchieri¹, A. Raichoor^{3,4}, R. S. Ellis², and T. Treu⁵

2017

Ottobre 2017...

DRAFT VERSION OCTOBER 30, 2017
Preprint typoset using L^AT_EX style emulatiopt v. 01/23/15

THE KMOS CLUSTER SURVEY (KCS) III: FUNDAMENTAL PLANE OF CLUSTER GALAXIES AT $z \approx 1.80$ IN JKCS 041*

LAURA J. PRICHARD^{1*}, ROGER L. DAVIES¹, ALESSANDRA BEFFIONI^{2,3}, JEFFREY C. C. CHAN^{2,3,4}, MICHELE CAPPELLARI¹, RYAN C. W. HOUGHTON¹, J. TREVOR MENDEL^{3,5}, RALF BENDER^{3,5}, AUDREY GALAMETZ³, ROBERTO P. SAGLIA^{1,3}, JOHN P. STOTT^{1,6}, DAVID J. WILMAN^{2,3}, IAN J. LEWIS¹, RAY SHARPLES¹, AND MICHAEL WEGNER⁷

Draft version October 30, 2017