Istituto Nazionale di Astrofisica

Osservatorio astronomico di Brera

INAF ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
NATIONAL INSTITUTE FOR ASTROPHYSICS

Universo in fiore

Introduzione all'astronomia

Ilaria Arosio

Ilaria.arosio@brera.inaf.it

INAF-Osservatorio Astronomico di Brera

10 ottobre 2017

Osservatorio Astronomico di Brera

INAF

Uscite di Sicurezza
vie di fuga in caso di Emergenza



Punto di ritrovo

Piazzetta Brera



Fondato intorno al 1762,
l'OAB è la più antica istituzione di ricerca scientifica di Milano

Il grande telescopio di Schiaparelli


OSSERVATORIO
ASTRONOMICO DI TORINO
ISTITUTO DI FISICA DELLO
SPAZIO INTERPLANETARIO
DI TORINO *
TORINO
OSSERVATORIO
ASTRONOMICO
DI CAPODIMONTE (NA)
ATANIA
OSSERVATORIO
ASTROFISICO DI CATANIA
O DI PALERMO
STROFISICA
ICA COSMICA

Subaru – Gia
Ø 8,2 m

Haw i

Keck I & I
Ø 1

a

05 05 2000



European Extremely Large Telescope



Cosa fa un astronomo?



Cosa fa un astronomo?


FLATRON
LG
SAOimage ds9
M2sum.fits[UVM2]
Annulus
Parameters
Number 1
Center 4:09:52.035 -56:07:03.24 fk5
Radius 0 180 arcsec
Annuli 17
Apply
Generate
Close
Radial Profile Plot (annulus regions: options: none) <4>
funcnts(ngc1533_sum.evt[EVENTS,PI=50:500])
surf_bri(cnts/arcsec**2)
avg_radius(arcsecs)
Radial Profile Plot (annulus regions: options: none)
funcnts(/home/ishtar/data/SWIFT/Earlytypes/ngc1533/M2sum.fits[UV
esito proposal su tempo italiano Swift
Ginevra Trinchieri
Gianpiero Tagliaferri
Cara Ginevra
e' con piacere che ti comunico che il tuo proposal Swift su tempo italiano e' stato approvato per un totale di 200 ks (2 sorgenti).
Dovresti ora mandarmi un mail (in inglese) con scritto in 1-2 righe se ci sono particolari richieste di puntamento, tipo: trigger sotto certe condizioni, osservazioni che vanno fatte in una certa finestra temporale, simultanee con





Anno	Popolazione 1º gennaio	Nascite	Tasso di natalità in ‰	Tasso di fecondità	Morti	Tasso di mortalità in ‰
1960	50.025.501	923.004	18,3	2,41	480.848	9,5
1970	53.685.301	917.496	17,0	2,43	528.622	9,8
1980	56.388.481	657.278	11,6	1,64	559.376	9,9
1990	56.694.360	580.761	10,2	1,33	544.397	9,5
2000	57.679.895	543.039	9,4	1,24	560.241	9,6
2010[10]	60.340.328	n.d.	9,2	1,40	n.d.	9,7
Anno	**Popolazione 1º gennaio**	**Nascite**	**Tasso di natalità in ‰**	**Tasso di fecondità**	**Morti**	**Tasso di mortalità in ‰**


$a^n + b^n = c^n$, $n, a, b, c \in N$, $n > 2$
$\varphi(x) = \sum_{k \in z} u(k)\sqrt{2}\varphi(2x-k)$
$\hat{\varphi}(\xi) = \prod_{j=1}^{\infty} m_0(\xi/2^j)$
$\langle \psi_{j,k} - \psi_{l,m} \rangle = \delta_{j,l} - \delta_{k,m}$
$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\xi) e^{ix\xi} d\xi$

Proprietà della radiazione elettromagnetica

luce





Schema 1
LUNGHEZZA D'ONDA




Opacità atmosferica
100%
50%
0%
0.1 nm
1 nm
10 nm
100 nm
1 µm
10 µm
100 µm
1 mm
1 cm
10 cm
1 m
10 m
100 m
1 km
Lunghezza d'onda
Raggi gamma, raggi X e raggi ultravioletti
Luce bloccata dall'atmosfera superiore
(migliore osservazione dallo spazio).
Luce visibile
osservabile
dalla Terra,
con qualche
distorsione
atmosferica.
Maggior parte
dello spettro
infrarosso assorbito
dai gas atmosferici
(migliore
osservazione
dallo spazio).
Onde radio osservabili
dalla Terra.
Onde radio ad
alta lunghezza
bloccate.



L'astronomia

etimologicamente significa *legge delle stelle*
(dal greco: ἀστρονομία = ἀστῆρ/ἄστρον (stella) + νόμος (legge)),

è la scienza il cui oggetto è l'osservazione e la spiegazione degli eventi celesti.

Perseo
Ercole
Lucertola
Lira
Cigno
Triangolo
Andromeda
Ariete
Volpetta
Pegaso
Freccia
Delfino
Pesci
Cavallino
Aquila
Balena
Acquario
Scudo
Capricorno
Pesce Australe
Microscopio
Scultore
S
CDV 117°
18.2 FPS
2017-10-10 22:30:56 UTC+02:00


Grande Carro
settentrione
Sirio da 4000 a 2000 a.C
semina, straripamento Nilo, anno nuovo
Pleiadi nel I millennio a.C.
navigazione
levata eliaca inizio anno in Mesopotamia 2500 a.C.
N
E
O
S
Orsa Maggiore
Luna
Auriga
Giraffa
Orsa Minore
Drago
Corona B
Perseo
Cassiopea
Cefeo
Ercole
Toro
Triangolo
Andromeda
Lucertola
Cigno
Lira
Serp
Ariete
Volpetta
Freccia
Pegaso
Delfino
Aquila
Pesci
Cavallino
Balena
Acquario
Pesce Australe
Microscopio
Scultore



ESA

Capella
Perseo
Andromeda
Auriga
Triangolo
Gemelli
Ariete
Giove
Toro
Pesci
Cane Minore
Procione
Betelgeuse
Orione
Unicorno
Balena
Rigel
Sirio
Lepre
Cane Maggiore
Eridano
Fornace
Colomba
Bulino
S
Terra, Milano, 130m
FOV 111°
106 FPS
2012-12-05 22:58:48


HUBBLE ULTRA DEEP FIELD (HUDF)
4 hrs
2 hrs
0 hrs
6 hrs
8 hrs
22 hrs
20 hrs
10 hrs
18 hrs
-15°
-30°
-45°
-60°
-75°
-90°
Eridanus
Fornax
Phoenix
Pictor
Tucana
South Celestial Pole
Perseo
Andromeda
Triangolo
Ariete
Pesci
Balena
Eridano
Fornace
Colomba
Bulino
S
Terra, Milano, 130m
FOV 111°
106 FPS
2012-12-05 22:58:48

Hubble Ultra Deep Field:

Angolo di cielo grande quanto un decimo della luna piena

Hubble Ultra Deep Field:

Angolo di cielo grande quanto un decimo della luna piena

Ogni singolo punto luminoso in questo angolo di cielo

(ad eccezione di due sole stelle) è una galassia.




stella
stella



*“Attraverso lo spazio, l’universo mi circonda e mi inghiotte come un punto;
con il pensiero, io lo comprendo”*

Blaise Pascal





Se devo dire *dove* sono

(in termini di coodinate celesti)

non mi importa molto della distanza

ma se devo dire come sono sì…










inverno
estate


inverno
estate


inverno
estate


inverno
estate


inverno
estate


SISTEMA PLANETARIO
SOLE
57 909 176 km
MERCURIO
108 208 926 km
LUNA
VENERE
149 597 887,5 km
TERRA
227 936 637 Km
MARTE
778 412 027 Km
GIOVE
1 426 725 413 km
MIRANDA
UMBRIEL
TITANIA
ARIEL
SATURNO
URANO
2 870 972 220 km
NETTUNO
4 498 252 900 km
PLUTONE
5 906 376 272 km

Anno luce:

la distanza che la luce percorre in un anno

$$V = \frac{s}{t}$$

$$Vt = s$$

$$300.000\,{}^{Km}\!/_{s} \cdot 365g \cdot 24h \cdot 60m \cdot 60s = 9{,}4 \cdot 10^{12}\,Km$$

$$1\ \text{anno luce} \approx 9.400.000.000.000 \cdot Km$$


https://maps.google.it/maps?q=milano&ie=UTF-8&ei=CIbvUv-_L87G7AbrnYGoDg&ved=0CAcQ
Internet Link PN51T
da Milano a Genova - Goog...
Google
milano
Accedi
Indicazioni stradali
I miei luoghi
A Milano, MI
B Genova, GE
Aggiungi destinazione - Mostra opzioni
TROVA INDICAZIONI STRADALI
Percorsi suggeriti
A7 147 km, 1 ora 46 min
Nel traffico attuale: 1 ora 50 min
A7 e E25 164 km, 1 ora 50 min
Nel traffico attuale: 1 ora 54 min
E25 212 km, 2 ore 15 min
Nel traffico attuale: 2 ore 21 min
Oppure con Trasporto pubblico (Treno, un trasbordo) 2 ore 40 min
Indicazioni stradali per Genova
Il percorso prevede il pagamento di pedaggi.
Milano
1. Procedi in direzione est da Via Tommaso
Satellite
Traffico
Milano
Genova
Torino
Ligurian Sea
Modifica in Google Map Maker
Segnala un problema
IT
13:23
03/02/2014


SISTEMA SOLARE
778 412 027 Km
1 426 725 413 km
SATURNO
URANO
2 870 972 220 km
NETTUNO
4 498 252 900 km
PLUTONE
5 906 376 272 km
ANGELO MOLINARI

1838 – F.Bessel

Misura la prima parallasse stellare:



1838 – F.Bessel

Misura la prima parallasse stellare:



1838 – F.Bessel

Misura la prima parallasse ste

61 Cigny

O da
da significa
distinguere
mensioni angolari di
una moneta vista da 16
Km di distanza

È una delle più vicine!

La stella sta a circa 11 anni luce

≈ **100.000.000.000.000** Km

4,2 anni luce

≈ **40.000.000.000.000** Km



… a piedi , senza fermarsi mai, ma… Mai, mai, mai…

a 6 km/h

Circa 760 milioni di anni



…con una moderna sonda

(es. Exomars a 95000 km/h)

48.000 anni

Fu l'Era glaciale a far estinguere i Neandertal?

Circa 50 mila anni fa i Neandertal si estinsero quasi del tutto. Il loro declino sarebbe quindi iniziato molto tempo prima dell'arrivo in Europa degli uomini moderni: lo rivela una nuova ricerca

di Alice Danti



Australopithecus afarensis
entre 4 e 2,7 milhões de anos

Homo habilis
entre 2,3 e 1,4 milhões de anos

Homo erectus
entre 1,8 milhões e
300 mil anos

Homo neanderthalensis
entre 250 e
30 mil anos

Homo sapiens
200 mil anos atrás até hoje

Perché è importante il concetto di distanza?



L'astrofisica

è quella branca dell'astronomia o della fisica che studia le proprietà fisiche, ovvero tutti i vari fenomeni, della materia celeste.

La materia è composta da:







neutroni

protoni



«Sei solo materia e radiazione!»
«Materia e radiazione!»
«Sei solo materia e radiazione!»


PINK
FLOYD
THE
DARK SIDE
OF THE
MOON


SPETTROSCOPIO
GAS CALDO E DENSO

sorgente
di
luce
bianca




schermo


T = 12,000 K
λm ≈ 250 nm
T = 6000 K
λm ≈ 500 nm
T = 3000 K
λm ≈ 1000 nm
Brightness
0
500
1,000
1,500
2,000
Wavelength (nm)

Angelo Secchi (1818 – 1878)

Padre **Angelo Secchi** è stato un gesuita e astronomo italiano, fondatore della spettroscopia astronomica. Fu direttore dell'Osservatorio Vaticano e si occupò per primo di classificare le stelle in classi spettrali.



LAMPADA
A GAS RAREFATTO

SPETTROSCOPIO



Nel 1859 Robert Wilhelm Bunsen e Gustav Robert Kirchhoff misero a punto il primo spettroscopio, uno strumento estremamente utile nella ricerca e nel riconoscimento di nuovi elementi.

Nel 1860 gli stessi Bunsen e Kirchhoff identificaticarono il cesio e il rubidio dalle linee di emissione dei loro spettri atomici. Gli elementi presero il nome dal colore delle linee, rispettivamente celesti e rosse.

Il tallio e l'indio, il gallio e i gas nobili vennero riconosciuti grazie alle linee di emissione.

Per esempio l'elio fu rilevato nella corona solare nel 1868 prima ancora che sulla Terra.


e-
e-
e-
NUCLEO DI
UNATOMO


e-
NUCLEO DI
UNATOMO


e-
NUCLEO DI
UNATOMO

LAMPADA
A GAS RAREFATTO

SPETTROSCOPIO



Nel 1859 Robert Wilhelm Bunsen e Gustav Robert Kirchhoff misero a punto il primo spettroscopio, uno strumento estremamente utile nella ricerca e nel riconoscimento di nuovi elementi.

Nel 1860 gli stessi Bunsen e Kirchhoff identificaticarono il cesio e il rubidio dalle linee di emissione dei loro spettri atomici. Gli elementi presero il nome dal colore delle linee, rispettivamente celesti e rosse.

Il tallio e l'indio, il gallio e i gas nobili vennero riconosciuti grazie alle linee di emissione.

Per esempio l'elio fu rilevato nella corona solare nel 1868 prima ancora che sulla Terra.


SPETTROSCOPIO
GAS
RAREFATTO
FREDDO
GAS CALDO E DENSO


Spectra of ordinary stars
K5V star
A0V star
Intensity or Transmission
0
2
4
6
8
10
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
Wavelength (Angstroms)
Wavelength (nm)

NGC 2903


$F_\lambda/F(5500)$ [Counts]
0.5
1.5
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
λ [Å]


F_λ [erg s^{-1} cm^{-2} Å^{-1}]
1.0e-12
2.5e-12
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
λ [Å]

La spettroscopia
studia la distribuzione luce alle varie lunghezze d'onda

Negli spettri ci sono spesso righe di emissione



Radiazione prodotta da transizioni elettroniche all'interno degli atomi

Gran premio di Formula 1

Effetto Doppler

Se una sorgente luminosa si avvicina le lunghezze d'onda della radiazione diminuiscono

BLUE SHIFT



Se una sorgente luminosa si allontana le lunghezze d'onda della radiazione aumentano

REDSHIFT

Sorgente “a riposo”



Effetto Doppler – sorgente in allontanamento



Effetto Doppler – sorgente in allontanamento



le righe si spostano quindi verso il rosso: **redshift**

Effetto Doppler

(non relativistico)

$$\frac{\lambda_0 - \lambda}{\lambda_0} = \frac{v_s}{c} \approx z$$


Wavelength (angstroms)
3500
4000
4500
5000
200
400
600
800
Alkaline earth metals
Alkali metals
Transition metals
Halogens
*Lanthanides
†Actinides
schermo



1,3 secondi luce



Luna


8 minuti luce
Sole

12 minuti luce



Marte

Marte
12 minuti luce

80 minuti luce



Saturno


80 minuti luce
Giapeto


80 minuti luce
Giapeto davanti a Saturno

3300 anni luce

Nebulosa planetaria - Occhio di gatto

Nebulosa del granchio - Resto di supernova



V838 Monocerotis – stella variabile

32600 anni luce
Ammasso di stelle M80

Formazione stellare nella piccola nube di Magellano

25 milioni di anni-luce
Galassia M101

31 milioni di anni-luce
Galassia vortice M51

63 milioni di anni-luce



Le antenne – Galassie interagenti NGC 4038, 4039

69 milioni di anni-luce

Galassia barrata NGC 1300

129 milioni anni luce



Galassie interagenti NGC 2207 e IC 2163

300 milioni di anni-luce
Galassia Anello – AM 0644-741

300 milioni di anni-luce

I topi – Galassie interagenti NGC 4676


300 milioni anni luce
Galassie interagenti Arp 87

2,2 miliardi di anni luce

Ammasso di galassie Abell 1689



Hubble Ultra Deep Field:

Angolo di cielo grande quanto un decimo della luna piena

Ogni singolo punto luminoso in questo angolo di cielo (ad eccezione di due sole stelle) è una galassia.




stella
stella



«Equipaggiato dei suoi cinque sensi, l'uomo esplora l'universo attorno a lui e chiama l'avventura Scienza.»

Edwin Hubble

Buona serata!
Ilaria Arosio


Dobbiamo anche confidare un poco in ciò che
Galileo chiamava la cortesia della Natura,
in grazia della quale talvolta da parte inaspettata
sorge un raggio di luce ad illuminare
argomenti prima creduti inaccessibili alle
nostre speculazioni [...].
Speriamo dunque.
E studiamo
G.V. Schiaparelli,
in *Il pianeta Marte*, 1893