Istituto Nazionale di Astrofisica

Osservatorio astronomico di Brera

Universo in fiore

Struttura a Larga Scala

Angela Iovino

angela.iovino@brera.inaf.it

INAF - Osservatorio Astronomico di Brera

La via Lattea vista dalla cima dell'osservatorio di Mauna Kea

Wally Pacholka / AstroPics.com

La Dea Nut

Origine della Via Lattea
(Tintoretto, c. 1570)

Quando abbiamo cominciato ad avere un'idea delle dimensioni del Cosmo?

1 Peculiarità delle distanze astronomiche ...

Osserviamo dalla Terra ...

1 Peculiarità delle distanze astronomiche ...

1 Osserviamo dalla Terra ...

Peculiarità delle distanze astronomiche ...

1 Peculiarità delle distanze astronomiche ...

Il concetto di lampione standard

La luminosità osservata cala con il quadrato della distanza !

$L=100\text{ W}$

Brillante!

Debole!

vicino

lontano

La luminosità osservata cala con il quadrato della distanza !

La luminosità osservata cala con il quadrato della distanza !

2

Gli oggetti che osserviamo sono molto deboli ...

Venere
10'000 fotoni

Andromeda
1 fotone

2

Gli oggetti che osserviamo sono molto deboli ...

Venere
10'000'000'000
fotoni

Andromeda
1'000'000 fotoni

Galassie piu' distanti
1 fotone

2

Gli oggetti che osserviamo sono molto deboli ...

... abbiamo bisogno di strumenti potenti, con detectors sensibili, meccanica precisa, e possibilmente fuori dall'atmosfera !

3

Gli oggetti che osserviamo
sono molto lontani ...

Luna → Terra
1.25 secondi

Sole → Terra
8 minuti

Andromeda → Terra
2.5 milioni di anni

Velocità finita di
propagazione
della luce

3

Gli oggetti che osserviamo
sono molto lontani ...

Luna → Terra
1.25 secondi

Sole → Terra
8 minuti

Andromeda → Terra
2.5 milioni di anni

guardare lontano nello spazio

≡

guardare lontano nel tempo

guardare lontano nello spazio
≡
guardare lontano nel tempo

Telescopio → **macchina del tempo!**

guardare lontano nello spazio
≡
guardare lontano nel tempo

Telescopio → **macchina del tempo!**

Dobbiamo esser
sicuri che
i lampioni vicini
a noi siano uguali
a quelli distanti
da noi!

Struttura a Larga Scala

Il telescopio Leviatano di lord Rosse

Struttura a Larga Scala

1845

Il telescopio Leviatano di lord Rosse

1845

Il telescopio Leviatano di lord Rosse 1845

Quando abbiamo cominciato ad avere un'idea delle dimensioni del Cosmo?

Un avanzamento tecnologico permise il salto di qualita' nelle osservazioni ...

Quando abbiamo cominciato ad avere un'idea delle dimensioni del Cosmo?

Un avanzamento tecnologico permise il salto di qualita' nelle osservazioni ...

Prima immagine della luna di John Draper: daguerrotipo del 1839

Edward Pickering
(1846-1919)

Harvard Observatory
ca. 1890

Edward Pickering
(1846-1919)

Arequipo Observatory
fine '800

Raccolta sistematica di lastre del cielo

La costellazione della
Croce del Sud

Le donne calcolatrici di Harvard (inizi '900)

L'harem di Pickering (Harvard 1913)

“Capable of doing as much good routine work as astronomers who would receive larger salaries. Three or four times as many assistants can thus be employed and the work done correspondingly increased ... “ Pickering – 1898

Henrietta Leavitt (1868-1921)

Le Nubi di Magellano

Henrietta Leavitt (1868-1921)

Struttura a Larga Scala

Henrietta Leavitt (1868-1921)

Struttura a Larga Scala

Relazione Periodo-Luminosita'

Periodo $\rightarrow$ Luminosita' $\rightarrow$ Distanza

Nel frattempo nuove scoperte ...

Un fenomeno che tutti conosciamo

Lo spettro del Sole

Le righe corrispondono agli assorbimenti prodotti da diversi elementi (idrogeno, elio etc.)

Un semplice modello ...

Misure di V. Slipher (AAS - 1914)
delle nebulose

Lo spettro di una nebulosa a spirale

Le stesse righe ma spostate rispetto a quelle misurate in laboratorio !

Effetto Doppler per le onde sonore

Lo spostamento delle righe spettrali è subito interpretato come effetto Doppler

SPECTROGRAPHIC OBSERVATIONS OF NEBULAE.

BY V. M. SLIPHER.

N.G.C.	221	Velocity	— 300 km	} These nebulae are on the south side of the Milky Way.
	224 †		— 300	
	598		—	
	1023		+ 200 roughly	
	1068		+ 1100	
	7331		+ 300 roughly	
	3031		+ small	} These are on the north side of the Milky Way
	3115		+ 400 roughly	
	3627		+ 500	
	4565		+ 1000	
	4594		+ 1100	
	4736		+ 200 roughly	
	4826		+ small	
	5194		± small	
	5866		+ 600	

Ma quale è il significato di questa straordinaria scoperta ??

1917 Telescopio Hooker a Mt. Wilson

2.5 mt di diametro e tecnologia nuova

1917 Telescopio Hooker a Mt. Wilson

1919 Edwin Hubble arriva a lavorare a Mt. Wilson

Edwin Hubble (1889-1953)

Andromeda e' un sistema stellare esterno alla nostra galassia !

ca. 1920

Edwin Hubble (1889-1953)

Andromeda e' un sistema stellare esterno alla nostra Galassia !

La nostra Galassia non e' tutto l'Universo!
(ca. 1920)

Hubble nel 1929 usando le Cefeidi e la legge di Leavitt per calibrare le distanze fa una scoperta incredibile!

Velocità di allontanamento delle galassie

Distanza delle galassie

La recessione delle galassie (1929-1931)

Velocità di allontanamento delle galassie

Distanza delle galassie

H_0 : Costante di Hubble

Inizia la cosmologia moderna:

✦ Viviamo in un Universo in espansione

Inizia la cosmologia moderna:

✦ Viviamo in un Universo in espansione

✦✦ Viviamo in un Universo che ha avuto un inizio

che e' esistito per un tempo finito!

La costante di Hubble

✦ e' necessaria per misurare la scala delle distanze = quanto son distanti le galassie che osserviamo ?

Lo spettro delle galassie

Il codice a barre che per ciascuna galassia ci permette di misurarne la distanza !

La distribuzione delle galassie

~1950 : si osserva la struttura filamentare della distribuzione in cielo delle galassie

~ 1980 : si misurano le velocità di recessione di grandi numeri di galassie ...

Invertendo $v = H_0 d$ se ne ottiene la distanza !

CfA Survey - 1985-1995

Struttura a Larga Scala

Margaret Geller

John Huchra

Negli ultimi 10 anni abbiamo allargato di molto la porzione di Universo di cui abbiamo una cartografia precisa, anche grazie a strumenti che ci permettono di misurare lo spettro di centinaia di galassie simultaneamente!

Sloan Digital Sky Survey

<http://skyserver.sdss.org>

<http://www.sdss.org>

TELESCOPIO 2.5 m:

Con una sola posa

- spettrografo: ~600 oggetti
- camera: 8x area luna piena

ALCUNI NUMERI:

1/4 del cielo

1.000.000 galassie

10.000 gradi quadrati

Dove vivono le galassie?

CAMPO SPOPOLATO

Struttura a Larga Scala

Gruppi e ammassi di galassie

CAMPO DENSO

La costante di Hubble

✦ e' necessaria per misurare la scala delle distanze = quanto son distanti le galassie che osserviamo ?

✦✦ e' necessaria per misurare la scala dei tempi = quale e' l'eta' dell'Universo?

$$t \approx \frac{d}{v} = \frac{1}{H_0}$$

Torniamo ai primi decenni del 1900

Teoria della Relatività Generale (1915)

**Modello di Universo statico
con costante repulsiva Λ (1917)**

*"Gravely detrimental to the formal
beauty of the theory"* Einstein 1919

Torniamo ai primi decenni del 1900

Teoria della Relatività Generale (1915)

**Modello di Universo statico
con costante repulsiva Λ (1917)**

La legge di Hubble (1929-1931)

Ma qualcuno aveva già previsto l'espansione ...

Alexander
Friedmann
(1888-1925)

Nel 1922 deriva soluzioni di Universo in espansione dalla teoria della Relatività Generale

Ma qualcuno aveva già previsto l'espansione ...

Georges
Lemaitre
(1894-1966)

Nel 1927 (e indipendentemente da Friedmann)
propone un modello di Universo in espansione e
prevede l'esistenza della legge di Hubble.

Einstein in visita a Mt Wilson (1931)

© Copyright California Institute of Technology. All rights reserved.
Commercial use or modification of this material is prohibited.

Einstein riconosce il suo errore!

Ma i nuovi modelli implicano un importante cambiamento di paradigma:

L' universo non è eterno, ma è esistito per un tempo finito!

Tre son le possibili classi di modelli :

Universo chiuso

Universo piatto

Universo aperto

sum of angles
 $> 180^\circ$

sum of angles
 $= 180^\circ$

sum of angles
 $< 180^\circ$

Densità di materia

Tre son le possibili classi di modelli :

Universo aperto

Universo piatto

Universo chiuso

Tre son le possibili classi di modelli :

Densità di materia

Universo chiuso

Universo aperto

Con diverse previsioni sul destino dell'Universo:

Abbiamo quindi una scala dei tempi ...

$$t \approx \frac{d}{v} = \frac{1}{H_0}$$

...e di conseguenza ciò che Lemaître definì
ipotesi dell'atomo primigenio

Big Bang!

Tuttavia passeranno ancora 30 anni
prima che l'idea venga accettata

Problemi osservativi
Diffidenza concettuale

Problemi osservativi ...

Età dell'Universo

Il valore di H_0 stimato da Hubble implicava come età dell'Universo solo 2 miliardi di anni!

**Datazione di meteoriti/rocce:
età del sistema solare: 4.5 miliardi di anni!
C. Patterson 1956**

**Limite inferiore età
dell'Universo**

Maggiore di quella stimata dall'espansione!

Diffidenza concettuale ...

Principio Cosmologico

Il nostro punto di osservazione
NON
è privilegiato

Isotropia
osservata

Omogeneità

Aggiungendo anche invarianza nel tempo:
Principio Cosmologico Forte

Big Bang

VS

Stato Stazionario

Stato Stazionario

Un Universo senza inizio né fine, in espansione ma con creazione continua di materia

Un atomo di idrogeno per m^3
in un miliardo di anni !

Big Bang

La densità delle galassie cala mentre l'universo si espande

Stato Stazionario

La densità delle galassie resta costante mentre l'universo si espande

Big Bang

??

Stato Stazionario

Nucleosintesi primordiale

La teoria del Big Bang spiega perfettamente le abbondanze osservate di idrogeno elio e deuterio

Per gli elementi fino al Ferro la produzione si sposta all'interno delle stelle più massicce!

E il resto ?

Si usa quanto scoperto da Burbidge M.&G., Fowler e Hoyle (1957).

Teoria dello stato stazionario

Problema della formazione degli
elementi pesanti ...

Soluzione proposta da
Burbidge M.&G., Fowler
e Hoyle (1957).

B²FH

© Copyright California Institute of Technology. All rights reserved.
Commercial use or modification of this material is prohibited.

Teoria dello stato stazionario

© Copyright California Institute of Technology. All rights reserved.
Commercial use or modification of this material is prohibited.

Teoria dello stato stazionario

© Copyright California Institute of Technology. All rights reserved. Commercial use or modification of this material is prohibited.

Supernova 1994 D
nella galassia NGC 4526

Il B²FH risolve il problema!

Nobel per la Fisica nel 1982 a Fowler

Nuove misure della costante di Hubble (1980→2001)

Nuove misure della costante di Hubble (2001)

Il valore oggi misurato per la costante di Hubble implica un'età dell'universo che è intorno ai 13.7 miliardi di anni, in ottimo accordo con stime indipendenti ottenute per l'età della nostra galassia.

Tabella Periodica degli Elementi

'We are all star stuff!' C. Sagan

Capisaldi osservativi della teoria del Big Bang:

- 1 • Spiega l'espansione dell'Universo
- 2 • Spiega le abbondanze cosmiche
- 3 • Spiega l'origine del CMB

Arno Penzias e
Robert Wilson

Radiazione
Cosmica di
Fondo (1964)

Immagine della Radiazione di Fondo Cosmica

L'impronta digitale della storia dell'universo

Struttura a Larga Scala